

Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas
de Matto Grosso ao Amazonas

Annexo N° 5

Historia Natural

ZOOLOGIA

TABANIDEOS

pele

DR. ADOLPHO LUTZ.



Papelaria Macedo

RIO DE JANEIRO

1912

TABANIDEOS

A COLLECÇÃO de cerca de 70 exemplares de tabanideos, reunida pelo Sr. A. M. RIBEIRO, offerece interesse especial por ter sido feita em grande parte em terreno inexplorado. Ao lado de especies conhecidas e na sua maior parte muito espalhadas, contem varias outras que considero novas. Infelizmente as circunstancias da viagem eram pouco favoraveis para a conservação perfeita, que é o ideal do dipterologista, em vista de tantas especies semelhantes. Todavia um estudo detalhado e um grande material de comparação me permittiram determinar as especies conhecidas e descrever as especies novas, de modo bastante satisfactorio, posto que imperfeito.

Dou em seguida a lista das especies encontradas e a descripção das especies novas :

- 1º *Erephopsis matto-grossensis* n. sp. Duas femeas.
- 2º *Chrysops leucospilus* WIED. Uma femea. Especie espalhada e bastante commum.
- 3º *Diachlorus bimaculatus* WIED. Cinco femeas apanhadas em 8 VIII 08 no rio PARAGUAY, acima de CORUMBÁ. A especie foi descripta por WIEDEMANN, como *Chrysops*, sem indicação da proveniencia. Conheço-a de S. PAULO (Nor-oeste), MINAS (Norte) e MATTO GROSSO onde parece frequente. Como a maior parte das especies deste genero attaca o homem.
- 4º *Lepidoselaga curvipes* FABR. Duas femeas apanhadas 2 e 4 dias acima de CORUMBÁ. Especie muito espalhada nas zonas mais quentes do Brasil e que tambem attaca ao homem.
- 5º *Tabanus mexicanus* L. Uma femea pequena com as azas sem manchas. Especie crepuscular um pouco variavel com distribuição muito vasta.
- 6º *Tabanus modestus* WIED. Uma femea que corresponde á definição de SCHINER. Especie commum e espalhada.
- 7º *Tabanus triangulum* WIED. Uma femea. Especie commum e espalhada, porém de identificação um pouco incerta, vista a confusão que reina neste grupo de especies.
- 8º *Tabanus leucaspis* WIED. Dez femeas. Especie commum nas zonas mais quentes do BRASIL.

Rum
0679

- 9° *Tabanus importunus* WIED. Oito femeas. Especie um tanto variavel, frequente nas regiões quentes do BRASIL.
- 10° *Tabanus lineifrons* n. sp. Nove femeas.
- 11° *Tabanus prunicolor* n. sp. Cinco femeas.
- 12° *Tabanus glandicolor* n. sp. Muitas femeas.
- 13° *Tabanus hesperus* n. sp. Tres femeas.
- 14° *Tabanus procallosus* n. sp. Tres femeas.
- 15° *Dicladocera unicolor* n. sp. Uma femea.

Erephopsis matto-grossensis n. sp. (Fig. 1)

COMPRIMENTO total, sem a tromba e as antenas, 15-17 mm. ; côr geral ocraceo pardacento.

Fundo da cabeça castanho, mais ou menos, avermelhado, com grande callo hemispherico no meio da face. Antennas de ocraceo ferrugineo ; palpos pardo-ocraceos, o segundo articulo bastante curto e largo, subanceolar. Tromba ennegrecida. Partes lateraes da face e fronte do castanho claro e matte. Olhos escuros, ocellos distinctos. Occiput coberto com pó amarellado. Barba esbranquiçada.

Thorax pardo, em cima coberto de pellos pardo-arruivados ; dos lados e em baixo ha pellos esbranquiçados. O escutello da côr do escudo.

Abdomen na sua totalidade da mesma côr que o escudo, em cima com pellos curtos, pardacentos ou arruivados.

Pernas pardo-ocraceas ; as partes acima dos joelhos e os pés um tanto mais escuros.

Azas quasi hyalinas com nervuras pardacentas. Terceira nervura a ramo anterior sem appendice e com angulo pouco accusado ; primeira cellula da margem posterior fechada antes da margem ; anal tambem, porém menos.

Halteres com hasta castanha e capitulo pardacento, bastante claro.

A descripção basea-se em duas femeas que se acham bastante estragadas e differem um pouco na côr. A primeira vista podiam ser confundidas com *E. leucopogon* WIED. ; distinguem-se porém facilmente pelos palpos que têm o segundo articulo mais curto e mais largo.

Dicladocera unicolor n. sp. (Fig. 2).

COR geral pardo-ferruginoso. Comprimento pouco acima de 15 mm.

Tromba preta, palpos pardo-ferruginosos, o segundo articulo bastante estreito, comprido e curvado ; antenas da mesma côr, o terceiro articulo com a ponta curvada e dente curvo na base ; face e fronte com fundo pardo-ferruginoso, esta com callo claviforme pardo. Olhos escuros (no estado secco).

Thorax pardo-ferruginoso, no escudo com traços indistinctos de faxas longitudinaes mais escuras.

Abdomen pardo-ferrugineo, com faixa dorsal mais escura, apenas indicada, no ventre a côr um tanto mais clara; margens posteriores dos segmentos com tarja clara estreita.

Pernas pardo-ferruginosas, apenas as tibias um pouco mais claras do que o resto. Não se percebe cilios nas tibias.

Azas tingidas de pardacento muito diluido, com estigma e nervuras castanhas e cellula costal côr de mel. Porção apical da segunda nervura mais espessa e escura; o mesmo se vê no ramo anterior da nervura III que não apresenta angulo distincto nem appendice na base. Primeira cellula posterior largamente aberta, anal fechada na margem. Escamas pardacentas, halteres castanhos com o capitulo claro na extremidade.

Descrição tirada de uma femea um tanto raspada.

Tabanus glandicolor n. sp. (Fig. 3).

COMPRIMENTO, sem as antenas, ca. de um centimetro; côr geral de bolotas seccas, mais clara ou mais escura.

Fundo da cabeça côr de bolotas, coberto de pó ou pellos esbradquiçados; Antennas com os articulos basaes ocraceos, terceiro ferruginoso, com a base muito larga e angulo dorsal muito acuzado; palpos ferrugineos, com pellos claros; tromba castanho-escura. Callo frontal comprido, linear, um tanto alargado na frente. Tuberculo ocellar escuro, triangular, mais ou menos coberto pelo pó esbranquiçado que cobre a fronte e o occiput. Olhos brilhantes, de côr chocolate.

Thorax: o fundo côr de bolotas clara, no escudo e escutello coberto por pruína esbranquiçada e pennugem pardacenta; pleuras e esterno com algumas manchas ennegrecidas, cobertas, com todo o fundo, por pollen claro.

Abdomen côr de bolotas, ora mais escura, ora mais clara, com indicação de faixa longitudinal clara no dorso; as margens dos segmentos geralmente mais claras. Pernas da côr do abdomen; as quatro tibias anteriores mais claras do que o resto das pernas.

Azas hyalinas, com as nervuras pardacentas. A costal, entre o estigma e o apice, a terminação da segunda e do ramo anterior da terceira nervura, como também a parte horizontal na base desta, tarjadas de pardo e rodeadas, ás vezes, de uma nuvem pardacenta; primeira cellula da margem posterior largamente aberta, anal fechada antes da margem. No ramo anterior da terceira nervura ha geralmente um appendice curto, mas não é constante.

Halteres côr de bolota.

Desta especie ha muitas femeas, porém geralmente mal conservadas. Todavia a côr uniforme de bolotas seccas é bastante caracteristica e, em conjuncto com os caracteres da aza e a faixa dorsal do abdomen, permite distinguir a especie de todas as outras já descriptas.

Tabanus procallosus n. sp. (Fig. 4).

COR geral pardo-ocraceo, azas hyalinas. Comprimento ca. de 1 cm. Tromba preta; palpos ocraceos, com pruina branca e pellos ennegrecidos; antenas pardas com pellos em parte pretos; o terceiro articulo curto, em cima com angulo saliente no primeiro segmento que tem mais do que a metade do comprimento do articulo; os outros quatro segmentos bastante grossos. Face ennegrecida, mas coberta de pruina clara e pellos brancos. Toda a fronte entre a base das antenas e o callo frontal formando um procallo glabro e saliente de castanho-claro luzidio. Espaço interocular com callo frontal assaz pequeno, claviforme, da mesma côr castanha; no resto o fundo castanho é coberto de pó amarellado. Do triangulo ocellar só se percebe o rudimento bastante nitido do ocello anterior. No occiput o fundo ennegrecido é coberto de pó branco. Olhos glabros, pretos em estado secco.

Thorax pardo; em cima o fundo mais alaranjado, com tres faxas longitudinaes pouco distinctas, mostra restos de pellos esbranquiçados; escutello pardo, mais ou menos, alaranjado. Pleuras e esterno com pô e pellos brancos sobre o fundo pardo.

Abdomen ocraceo, pardacento nos dois primeiros e ultimos segmentos, no resto mais alaranjado; margens posteriores dos anneis com cinta clara, estreita no ventre, mais larga no dorso, com resto de pellos brancos; no meio do dorso o alaranjado invade tambem os dois primeiros e o penultimo segmento.

Pernas pardas, acima do joelho um pouco avermelhadas; a base das tibias, nos dous primeiros pares até ao meio, no ultimo par até perto do ultimo quarto, de branco um tanto amarellado; o resto escuro, sem brilho, apenas os empodios um tanto ocraceos.

Azas hyalinas, as nervuras castanhas, o estigma mais amarellado; ramo anterior da terceira nervura sem apendice; primeira cellula da margem posterior largamente aberta, anal fechada perto da margem. Escamula pardacente, com margem estreita mais escura. Halteres castanhos, apenas a face terminal do capitulo clara ocracea.

A descripção basea-se em tres femeas bastante bem conservadas com excepção dos pellos.

Tabanus prunicolor n. sp. (Fig. 5).

COLORAÇÃO geral lembrando a das ameixas. Comprimento cerca de 1 cm. Tromba preta. Palpos ocraceos com pellos escuros; antenas ferrugineas, com pellos escuros, principalmente nos dois segmentos bazeas; segundo segmento muito curto, principalmente a face superior, o terceiro muito concavo em cima com angulo saliente. Fundo da cabeça geralmente coberto de pó branco amarellado; apenas os olhos de pardo-arroxeadado muito escuro, e o callo frontal variando de castanho avermelhado a preto luzidio. Barba cinzenta.

Escudo e escutello pardo-violaceos com pruina cinerea, os lados e a margem posterior mais avermelhados, como tambem duas estrias longitudinaes submedia-
nas, pouco distinctas, no escudo; pleuras e face inferior pardo-violaceos com prui-
na e pellos acinzentados.

Abdomen pardo-vermelho, mais ou menos arroxeadado; na sua totalidade ou apenas a partir do quarto anel muito escuro, quasi preto, mas com pruina acin-
zentada; em baixo como em cima. Margens posteriores dos segmentos com
tarjas claras muito estreitas, formadas por cilios e fundo claros.

Pernas pardo-ocraceos; o primeiro par em cima até o joelho, os demais até
ao meio do femur pardo-arroxeados ou avermelhados. No primeiro par a metade
apical da tibia e todo o pé pardacentos, os outros pés tambem, porém com excep-
ção da base.

Azas quasi hyalinas; cellula costal amarellada, a base e o estigma côr de
mel ou pardo-amarello; nervura costal preta, na parte apical mais ou menos tarjada
de pardo, como tambem a parte terminal curvada das duas nervuras esbocando an-
tes do apice que são um tanto espessados na margem. Ramo anterior da nervura
forqueada com angulo obtuso, sem apendice, mas tarjado de pardo na parte trans-
versal da base; primeira cellula da margem posterior largamente aberta, anal
fechada um tanto antes da margem. Escamula pardacentas com margem escura.
Halteres com a base ocracea, mais acima pardo de couro, tornando-se claro no
apice.

Esta especie se conhece facilmente porque na côr e no aspecto pruinoso lem-
bra as ameixas da Europa. A descripção está baseada em ciuco femeas, collecciona-
das no Estado de MATTO GROSSO pelo Sr. A. MIRANDA RIBEIRO.

***Tabanus lineifrons* n. sp. (Fig. 6.)**

COMPRIIMENTO, sem as antenas, ca. de 19 mm.; côr geral ferruginoso e
enegrecido, azas pardacentas.

Cabeça com fundo escuro, coberta com pó e pellos branco-acinzentados ou
amarellados. Tromba preta, estiletos pardo-avermelhados; palpos ocraceo-avorme-
lhados com pellos brancos; antenas pardo-amarellas ou ferruginosas, o terceiro ar-
ticulo muito concavo em cima e preto no apice. Frons muito estreita entre os
olhos, alargando-se um tanto para traz, com callo preto quasi linear, prolongado
em linha elevada muito fina que não excede o ultimo trecho do espaço interocular,
onde se percebe o tuberculo ocellar em forma de ponto, estria ou triangulo es-
treito.

Thorax ennegrecido, com pó cinzento. Prothorax, região da base das azas e
callos em frente destas vermelho-amarellados ou pardacentos; no escutello vestigios
de pellos amarellados curtos; em baixo ha outros um tanto mais cumpridos, cin-
zento-amarellados.

Abdomen ferrugineo até ferruginoso, frequentemente em parte ennegrecido,
devido a sangue absorvido; os dous segmentos terminaes ennegrecidos, com pellos

pretos. Encontram-se outros restos de pellos pretos e amarellados, estes nas margens lateraes dos segmentos e na margem posterior dos mesmos, onde o fundo é mais claro.

Pernas pretas; tibias anteriores na metade basal, as outras nos dous terços superiores, amarelladas, porém a face dorsal da ultima tibia com cilios pretos sobre o fundo ennegrecido; empodios amarellados, pés do meio e de traz com alguns cilios ruivos na face ventral.

Azas pardacentas, apenas a cellula costal amarella; a raiz, o estigma e as outras cellulas da margem anterior mais escuras, a discoidal, a anal e as duas basaes mais claras. Nervuras transversaes, parte transversal na base e appendice do ramo anterior da nervura forqueada mais ou menos distinctamente tarjada de pardo; todas as nervuras escuras e bem destacadas. Primeira cellula da margem posterior largamente aberta, anal fechada á pequena distancia da margem.

Halteres pardacentos, com a face terminal amarellada.

Dos nove exemplares procedendo de Matto Grosso nenhum mostrou indicação de faxas nos olhos, mesmo depois de bastante demora na camara humida. Se existissem em estado fresco, o que não acredito, a especie entraria no meu genero *Macrocornus*.

***Tabanus hesperus* n. sp. (Fig. 7).**

COMPRIIMENTO, sem as antenas, 19 mm. Cór geral parda e ferruginosa. Fundo da cabeça avermelhado densamente coberto com pó alvacento. Tromba ennegrecida, os estiletes pouco mais curtos do que os palpos ocraceos, cobertos de pellos esbranquiçados. Antenas bastante curtas, os articulos basaes pardos, o terminal, de ferrugineo claro e vivo, tem a base larga e o angulo dorsal muito saliente, mas sem dente. Callo frontal pardo-ferruginoso, claviforme; tuberculo ocellar obliterado. Olhos seccos bronzeados, as facetras muito finas. Occiput um tanto ennegrecido na parte que corresponde aos olhos. Barba alvacentas.

Thorax em cima pardo ferruginoso; margem posterolateral do escudo e anterior do escutello, duas estrias longitudinaes de ocraceo ferrugineo, tudo coberto de cilios dourados muito finos e curtos; escutello na margem anterior com faixa pardo-ferruginosa, metade posterior amarello-alaranjada. Resto do thorax com fundo pardacento coberto por pó e pennugem esbranquiçados.

Dorso do abdomen de ocraceo alaranjado e restos de pellos escuros, as margens posteriores dos segmentos muito mais claras, amarelladas, ventre ocraceo pallido coberto com pruina e pellos esbranquiçados.

Pernas em parte pardo-ocraceas, em parte pardo-ferruginosas, os pés ennegrecidos, os pellos claros e escuros correspondendo ao fundo; no dorso da tibia do ultimo par ha uma fileira de cilios pretos.

Azas quasi hyalinas, a costal e a subcostal pretas; base da aza e cellula costal côr de mel, o estigma pardo amarello, as nervuras em redor das cellulas basaes, o ramo posterior da quinta e a base da anal pardo-escuros e espessados, as outras mais finas, ennegrecidas; ramo anterior da terceira nervura com angulo arredon-

dados sem apêndice; primeira cellula da margem posterior largamente aberta, anal fechada um pouco antes da margem. Escamula parda com margem clara, halteres alaranjados com face terminal esbranquiçada.

A descripção se refere a uma fêmea colleccionada em Matto Grosso pelo Sr. A. Miranda Ribeiro. A especie parece-se á primeira vista com o *Tabanus aurora* de MACQUART, mas além de outros caracteres tem as antenas totalmente diferentes.







AVISO

A disponibilização (gratuita) deste acervo, tem por objetivo preservar a memória e difundir a cultura do Estado do Amazonas. O uso destes documentos é apenas para uso privado (pessoal), sendo vetada a sua venda, reprodução ou cópia não autorizada. (Lei de Direitos Autorais - [Lei nº 9.610/98](#)). Lembramos, que este material pertence aos acervos das bibliotecas que compõem a rede de bibliotecas públicas do Estado do Amazonas.

EMAIL: ACERVODIGITALSEC@GMAIL.COM



Secretaria de
Estado de Cultura

